

Feminella Vagi C

Вагинални таблетки

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪСТАВ

Всяка вагинална таблетка съдържа: 250 mg витамин С (аскорбинова киселина), силиконова смола, лактозен монохидрат, хидроксил-пропил-метилцелулоза, магнезиев стеарат.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Вагиналните таблетки Feminella Vagi C са създадени за естествена защита на вагиналната микросреда чрез поддържане или възстановяване на физиологичното рН. Прилагането на вагиналните таблетки Feminella Vagi C превръща бързо вагиналната среда в неподходяща за растежа на нежелани анаеробни микроорганизми, отговорни за развитието на бактериална вагиноза, също и по време на бременността. Вагиналните таблетки Feminella Vagi C подпомагат лечението и профилактиката на бактериалната вагиноза. Те са особено полезни при пациентки с рецидив на заболяването и като последваща терапия след прилагането на традиционните антибиотици.

ДОЗИРОВКА

Поставете една вагинална таблетка дневно, за предпочитане вечер преди лягане. Съветваме Ви да прилагате лечението поне 6 дни, за да възстановите физиологичното рН и нормалната вагинална флора. При необходимост, лечението може да бъде продължено или повторено.

КАКЪВ Е НАЧИНЪТ НА ПРИЛАГАНЕ НА Feminella Vagi C

Вагиналните таблетки Feminella Vagi C трябва да се поставят дълбоко във вагината. Вагиналните таблетки Feminella Vagi C предпазват влагалищната микросреда чрез контролираното освобождаване на витамин С в продължение на няколко часа, като по този начин осигуряват продължително подкиселяване на средата и бързо нормализиране на рН на влагалището.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Данни за свръхчувствителност към всяка една от съставките на препарата.

ВНИМАНИЕ

Да се пази от деца. Да не се поглъща.

БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ

Feminella Vagi C може да се прилага без никакъв риск при бременност и кърмене.

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

В редки случаи са възможни усещане за парене или интравагинален сърбеж. В отделни случаи е възможна свръхчувствителност към една или повече от съставките на продукта; в такива случаи се препоръчва прекратяване на употребата и консултация с лекар.

ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Витамин С може да повлияе определянето на глюкозурията, лактат дехидрогеназата, трансаминазите и билирубина. Витамин С намалява ефекта на антикоагулантите.

Производител: POLICHEM S.A., Via Senago 42/D -6912 Lugano Pazzallo, Швейцария.

FEMINELLA VAGI C SE РАЗПРОСТРАНЯВА В БЪЛГАРИЯ ОТ:

Анджелини Фарма България ЕООД
Адрес: гр. София 1592
Ул. „Асен Йорданов“ 10
Тел. + 359 2 975 13 95
Факс: + 359 2 971 57 45